

TEST AVANT RADIO ET PAS IRM

DR JM BONDEVILLE



RACHIS LOMBAIRE

AVANT D'OPÉRER POUR INSTABILITÉ DU RACHIS , LE CHIRURGIEN A BESOIN DE

- 1 IRM**
- 2 EOS OU TÉLÉRADIOGRAPHIES RACHIS ENTIER F/P**
- 3 RADIOGRAPHIES DYNAMIQUES LOMBAIRE F/EXTENSION**
- 4 SCANNER**

POIGNET TRAUMATIQUE INSTABLE

- **1. RADIOGRAPHIE F/P/ SCAPHOIDE**
- **2. SCANNER**
- **3. IRM**
- **4. RADIOGRAPHIE
F/P/INCLINAISON RADIALE ET
ULNAIRE**

CHEVILLE POST TRAUMATIQUE

- **SI CRITÈRES D'OTTAWA NÉGATIFS**
- **1. RIEN**
- **2. RADIO F/P**
- **3. RADIO F/P/ ROT INT / DÉROULE PIED**
- **4. SCANNER**
- **DOULEUR ET INSTABILITÉ A 12 SEM**
- **1. RADIO F/P/ ROT INT / DÉROULE**
- **2. IRM**
- **3. DYNAMIQUES : VARUS FORCE ET TIROIR ANTÉRIEUR**
- **4. ARTHROSCANNER**