

**FICHE PRATIQUE IDE  
ACCOMPAGNANT LES FICHES « PATIENTS COVID 19 EN SITUATION PALLIATIVE »**

**LA VOIE SOUS-CUTANÉE**

Ne doit être utilisée que si le malade ne peut pas être perfusé par voie IV.

Toutes les voies d'abord veineux sont envisageables : périphériques, Picc-Line, KT centraux des dialysés, chambres implantables.

Se référer aux protocoles du chu sur les voies sous-cutanées Référence GEDI 10196


Utiliser des micro-cathéters courts 22G référence 383328 , bleus Saf-T Intima

Le cathéter peut être lassé en place jusqu'à 5 jours en surveillant le point de ponction

Volume en SC directe : < à 2 ml si possible

Volume en SC lente en 3 min ou 10 min en perfusette soit 5ml/ min

Volume en perfusion SC continue en utilisant le NaCl 0,9 % sur 24h 10 à 11 ml/ h sans dépasser 30ml/h



S'assurer de la rotation des zones

**LA VOIE INTRA-VEINEUSE**

**IVD** : Intra Veineuse Directe. On injecte le médicament directement dans la veine sans utiliser une poche de perfusion.

On parle d'une durée courte, quelques secondes à une minute

**IVL**: Intra Veineuse Lente. Dans les protocoles, quand on parle d'IVL, soit via une seringue qu'on injecte lentement (3 min environ), soit via une poche de perfusion de 50 cc de NaCl 0,9% sur 10 min maximum

Privilégier les IVD ou les IVL sans poche de perfusion pour éviter les apports « pirates »

Effectuer les injections, et mettre les perfusions, les SAP ou les PCA au plus prêt du malade.

**LES MOLÉCULES UTILISÉES DANS LES PROTOCOLES « Patients Covid19 en situation palliative »**

DCI	Nom commercial	Voie continue possible SC	Voie continue possible IV	Dilution SC pour les bolus	Dilution IV pour les bolus
MORPHINE	Morphine	oui	oui	non	non IV lente
OXYCODONE	Oxynorm®	oui	oui	non	non IV lente
MIDAZOLAM	Hypnovel®	oui	oui	non	oui dans 50 cc de NaCl0,9%
CLONAZÉPAM	Rivotril®	ou	ou	oui QSP 2 ml	Oui QSP 2 ml
CLORAZÉPATE	Tranxène®	non	oui	non	oui dans 50 cc de NaCl0,9%
DIAZÉPAM	Valium®	oui mais préférable en discontinu sur autre voie d'abord	oui mais préférable en discontinu sur autre voie d'abord	non	non
CYAMÉMAZINE	Tercian®	oui	non	non	non
LEVOMÉPROMAZINE	Nozinan®	oui	non	non	non
CHLORPROMAZINE	Largactil®	oui	oui	non	non
SCOPOLAMINE BROMHYDRATE	Scopolamine®	oui	oui	non	nopn
SCOPOLAMINE BUTYLBROMURE	Scoburen®	oui	oui	non	non
FUROSÉMIDE	Lasilix®	non en discontinu sur autre voie d'abord	non en discontinu sur autre voie d'abord	non	non