

# DATATION DE GROSSESSE

Dr Chanteloube Céline  
GHH  
28/06/2022



# Datation de grossesse avant IVG ?

IVG possible en ville si terme < 9SA le jour de la prise de mifépristone.

**Recommandations CNGOF 2016 : « L'échographie avant une IVG doit être encouragée mais n'est pas indispensable pour réaliser une IVG. »**

- DDR uniquement : fiabilité ?
- Valeur du taux de HCG ?
- Concrètement au Havre : Accès assez rapide à l'échographie : A privilégier +++

# QUELQUES REGLES EN ECHOGRAPHIE



# Un sac gestationnel intra-utérin avec vésicule vitelline atteste du caractère endo-utérin de la grossesse.

*(Permet d'écarter la grossesse extra-utérine et les images de pseudosacs gestationnels)*





## Problème des grossesses débutantes

- Le taux sérique d'HCG double toutes les 48h en début de grossesse
- Grossesse visible à l'échographie uniquement lorsque HCG > 1000 UI/L
- Dans l'ordre
  - Endomètre épais
  - Puis apparition d'un petit sac millimétrique sans vésicule vitelline



**Grossesse de localisation indéterminée**





## **CAT si grossesse de localisation indéterminée :**

### Recommandation CNGOF :

*« En l'absence de facteurs de risque, une grossesse de localisation indéterminée n'est pas une contre indication à la prise en charge par voie médicamenteuse.*

*Il faut cependant*

- *Informar la patiente du risque de non-diagnostic de GEU et des signes qui doivent alerter.*
- *Réaliser un suivi par dosage plasmatique des BHCG avant et après la procédure. Une baisse des BHCG d'au moins 50% à J5 et 80% à J7 permet de conclure au succès de la procédure. »*

### En pratique :

- Ne pas faire d'échographie tant que taux d'hCG inférieur à 1000 UI/L
- Prévoir un contrôle échographique au bout d'une semaine si le sac gestationnel n'est pas encore visible ou doute sur pseudosac gestationnel.
- L'IVG médicamenteuse reste possible si possibilité de suivi régulier des HCG

**En l'absence d'embryon visible, le terme est toujours inférieur à 7 SA.**

*La datation se fait alors à partir du diamètre du sac gestationnel*




## Dès l'apparition échographique de l'embryon : La datation est réalisée à partir de la LCC de l'embryon

Longueur crânio-caudale (5.6 à 14.2 semaines) selon 



Image échographique en 2D  
Embryon de 4,8 mm



Trimestre 1  
Har. Elevée  
1000  
Gn 5  
95 7.11  
P4 / 50  
573.14

