


**Pré test**

1 - L'adénocarcinome gastrique est secondaire à une infection à Helicobacter Pylori dans :


37 réponses



**Post Test**

1 - L'adénocarcinome gastrique est secondaire à une infection à Helicobacter Pylori dans :

19 réponses




**Réponses**

C


2 - Quel examen proposé vous à une femme de 36ans qui présente une dyspepsie (épigastralgies modérées intermittentes, pesanteur...ents) depuis 6 mois sans pyrosis ni perte de poids

37 réponses



2 - Quel examen proposé vous à une femme de 36ans qui présente une dyspepsie (épigastralgies modérées intermittentes, pesanteur...ents) depuis 6 mois sans pyrosis ni perte de poids


19 réponses



C, E, F


3 - en France le taux de participation au test de FITest de :

37 réponses



3 - en France le taux de participation au test de FITest de :


19 réponses



B

4 - Le risque de niveau élevé comprend :


37 réponses



- A. Âge > 50 ans
- B. antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal
- C. Antécédents familiaux de cancer colorectal chez les parents de premier degré
- D. Polypose adénomateuse familiale
- E. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin

4 - Le risque de niveau élevé comprend :

19 réponses




- A. Âge > 50 ans
- B. antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal
- C. Antécédents familiaux de cancer colorectal chez les parents de premier degré
- D. Polypose adénomateuse familiale
- E. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin

A,B,C

5 - La découverte d'une lésion hépatique ayant des caractéristiques bénigne avec une stéatose justifie la poursuite des explorations ?

37 réponses



5 - La découverte d'une lésion hépatique ayant des caractéristiques bénigne avec une stéatose justifie la poursuite des explorations ?


19 réponses



A


6 - Une fois le diagnostic d'hyperplasie nodulaire focale posé, on surveille la lésion annuellement ?

37 réponses



6 - Une fois le diagnostic d'hyperplasie nodulaire focale posé, on surveille la lésion annuellement ?


19 réponses



B


7 - En cas d'hyperthermie post chimiothérapie/ immunothérapie à domicile :

37 réponses



7 - En cas d'hyperthermie post chimiothérapie/ immunothérapie à domicile :


19 réponses



D


8 - Concernant le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Quelles affirmations sont vraies :

37 réponses



8 - Concernant le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Quelles affirmations sont vraies :


19 réponses



A,C,D

9 - Dans le syndrome de l'intestin irritable, l'éviction alimentaire au long cours peut fréquemment être causée par :


37 réponses



- A. Un ARFID
- B. Au lien entre l'alimentation et les symptômes gastro-intestinaux
- C. Une prescription de régime inadaptée ou non suivie
- D. Une allergie alimentaire
- E. Une prescription médicale justifiée

9 - Dans le syndrome de l'intestin irritable, l'éviction alimentaire au long cours peut fréquemment être causée par :

20 réponses



- A. Un ARFID
- B. Au lien entre l'alimentation et les symptômes gastro-intestinaux
- C. Une prescription de régime inadaptée ou non suivie
- D. Une allergie alimentaire
- E. Une prescription médicale justifiée

A,B,C