





Post test	Réponse																					
Épaule mécanique Une femme de 55 ans présente une épaule douloureuse depuis huit semaines, devenue hyperalgique (EN 8/10) depuis 2 semaines, ...cisez vous systématiquement à l'interrogatoire ? 7 réponses  <table><thead><tr><th>Catégorie</th><th>Nombre de réponses</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Horaire</td><td>1</td><td>14,3 %</td></tr><tr><td>Horaire de la douleur</td><td>1</td><td>14,3 %</td></tr><tr><td>Mécanique ou inflammation</td><td>2</td><td>28,6 %</td></tr><tr><td>horaire mécanique ou inflammatoire</td><td>1</td><td>14,3 %</td></tr><tr><td>meccanique ou inflammatoire</td><td>1</td><td>14,3 %</td></tr><tr><td>nuit?</td><td>1</td><td>14,3 %</td></tr></tbody></table>	Catégorie	Nombre de réponses	Pourcentage	Horaire	1	14,3 %	Horaire de la douleur	1	14,3 %	Mécanique ou inflammation	2	28,6 %	horaire mécanique ou inflammatoire	1	14,3 %	meccanique ou inflammatoire	1	14,3 %	nuit?	1	14,3 %	Horaire mécanique ou inflammatoire
Catégorie	Nombre de réponses	Pourcentage																				
Horaire	1	14,3 %																				
Horaire de la douleur	1	14,3 %																				
Mécanique ou inflammation	2	28,6 %																				
horaire mécanique ou inflammatoire	1	14,3 %																				
meccanique ou inflammatoire	1	14,3 %																				
nuit?	1	14,3 %																				
2. Elle est enraidie passivement dans toutes les amplitudes au décours d'une tendinopathie. Vous concluez à une capsulite. Quelle est la conduite à... la plus adaptée parmi les propositions suivantes ? 7 réponses  <table><thead><tr><th>Proposition</th><th>Nombre de réponses</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Immobilisation + antalgiques</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>B. Immobilisation + antalgiques + prescription IRM + avis orthopédiste</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>C. Immobilisation + antalgiques + infiltration cortisonique gléno-humérale en urgence + Kiné e...</td><td>7</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>	Proposition	Nombre de réponses	Pourcentage	A. Immobilisation + antalgiques	0	0 %	B. Immobilisation + antalgiques + prescription IRM + avis orthopédiste	0	0 %	C. Immobilisation + antalgiques + infiltration cortisonique gléno-humérale en urgence + Kiné e...	7	100 %	C									
Proposition	Nombre de réponses	Pourcentage																				
A. Immobilisation + antalgiques	0	0 %																				
B. Immobilisation + antalgiques + prescription IRM + avis orthopédiste	0	0 %																				
C. Immobilisation + antalgiques + infiltration cortisonique gléno-humérale en urgence + Kiné e...	7	100 %																				
Ostéoporose. Vous recevez en consultation une patiente de 68 ans, munie des résultats d'une ostéodensitométrie réalisée suite à une fractu...t) la (les) proposition(s) exacte(s) la concernant ? 7 réponses  <table><thead><tr><th>Proposition</th><th>Nombre de réponses</th><th>Pourcentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Vous retenez une ostéoporose post ménopausique sans presc...</td><td>2</td><td>28,6 %</td></tr><tr><td>B. Cette fracture au poignet est considérée fracture sévère du f...</td><td>4</td><td>57,1 %</td></tr><tr><td>C. Un seuil de -2.5 DS est nécessaire pour retenir l'indicat...</td><td>3</td><td>42,9 %</td></tr><tr><td>D. Une mesure de la densitométrie au site fracturé,...</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>E. Le risque de nouvelles fractures est important en abse...</td><td>6</td><td>85,7 %</td></tr></tbody></table>	Proposition	Nombre de réponses	Pourcentage	A. Vous retenez une ostéoporose post ménopausique sans presc...	2	28,6 %	B. Cette fracture au poignet est considérée fracture sévère du f...	4	57,1 %	C. Un seuil de -2.5 DS est nécessaire pour retenir l'indicat...	3	42,9 %	D. Une mesure de la densitométrie au site fracturé,...	0	0 %	E. Le risque de nouvelles fractures est important en abse...	6	85,7 %	E			
Proposition	Nombre de réponses	Pourcentage																				
A. Vous retenez une ostéoporose post ménopausique sans presc...	2	28,6 %																				
B. Cette fracture au poignet est considérée fracture sévère du f...	4	57,1 %																				
C. Un seuil de -2.5 DS est nécessaire pour retenir l'indicat...	3	42,9 %																				
D. Une mesure de la densitométrie au site fracturé,...	0	0 %																				
E. Le risque de nouvelles fractures est important en abse...	6	85,7 %																				

B

Opiïdes 4. On fixe classiquement à 4/10 sur une échelle numérique (EN) le cut-off pour instaurer un traitement opioïde en situation de douleur aiguë.


7 réponses



A

5. En l'absence de bénéfice, en situation de douleur chronique non cancéreuse, il est recommandé de ne pas poursuivre un traitement opioïdes au-delà de 3 à 6 mois.


7 réponses



A


Lombalgie 6. Toute lombalgie aiguë fébrile est une spondylodiscite jusqu'à preuve du contraire.

7 réponses



7. Une lombalgie aiguë peut être traitée par corticoïdes per os.


7 réponses



B

8. Il est important d'évaluer les facteurs psychosociaux pour adapter la prise en charge.


7 réponses



A

Les arthropathies microcristallines 9. Aucune biothérapie anti-cytokinique n'est efficace dans la chondrocalcinose.

7 réponses




B

A

10. Un accès microcristallin goutteux peut élever la CRP à plus de 100 mg/l.


7 réponses



B

11. La posologie de la colchicine est de 1 mg X 3 pour traiter l'accès microcristallin aigu.


7 réponses



B

12. La colchicine ne s'associe pas aux corticoïdes.


7 réponses



B

13. Une douleur aiguë avec impotence fonctionnelle de l'épaule est toujours secondaire à une migration calcique.


7 réponses



B

14. La goutte n'atteint jamais le rachis.


7 réponses



B


Corticoïdes: indications et posologies 15. Les cures de prednisolone à 1 mg/kg en décroissance rapide sont un bon traitement des arthrites :

7 réponses



Corticoïdes: indications et posologies 16. La posologie maximale en équivalent Prednisone par indication est:

7 réponses



A, B, C

Corticoïdes: effets secondaires 17. Concernant la surveillance sous traitement par corticothérapie générale, Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) la concernant ?


7 réponses



C, D, E

Rhumatismes débutants du sujet âgé : 18. Est-il possible de diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde à 80 ans ?


7 réponses



A

19. Le seul rhumatisme qui touche les ceintures pelvienne et scapulaire après 65 ans est la pseudopolyarthrite rhizomélique.


7 réponses



B

Biothérapie: gestion des risques 20. Elle souhaite partir en Amazonie : le vaccin contre la fièvre jaune est contre-indiqué.


7 réponses



A

21. Elle doit se faire opérer de la cataracte: Vous lui recommandez de suspendre sa biothérapie 1 semaine avant la chirurgie.

7 réponses




B

B

22. Elle est sous Amoxicilline pour une bronchite infectieuse : vous reprenez la biothérapie dès le début des antibiotiques.


7 réponses



A

Le syndrome douloureux diffus 23. La douleur de la PR est de type nociplastique


7 réponses



B


24. La spondylarthrite n'entraîne pas de douleur diffuse

7 réponses



25. La PR et la fibromyalgie ne coexistent pas


7 réponses



B

26. Quels sont les 2 dosages utiles au diagnostic de la cause d'un syndrome douloureux diffus parmi les propositions suivantes?


7 réponses



A, C

27. Un syndrome douloureux diffus chez un patient avec du psoriasis cutané est une fibromyalgie

7 réponses



B