






Pré test	Post test	Réponse																																				
1 - Le bilan initial lors de la découverte d'un diabète consiste en la réalisation de : 30 réponses  <table border="1"><thead><tr><th>Option</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée</td><td>25</td><td>83,3 %</td></tr><tr><td>B. La réalisation d'une échographie abdominale</td><td>10</td><td>33,3 %</td></tr><tr><td>C. Le dosage des anticorps anti insuline</td><td>4</td><td>13,3 %</td></tr><tr><td>D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures</td><td>10</td><td>33,3 %</td></tr><tr><td>E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale</td><td>8</td><td>26,7 %</td></tr></tbody></table>	Option	Count	Percentage	A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée	25	83,3 %	B. La réalisation d'une échographie abdominale	10	33,3 %	C. Le dosage des anticorps anti insuline	4	13,3 %	D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures	10	33,3 %	E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale	8	26,7 %	1 - Le bilan initial lors de la découverte d'un diabète consiste en la réalisation de : 26 réponses  <table border="1"><thead><tr><th>Option</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée</td><td>18</td><td>69,2 %</td></tr><tr><td>B. La réalisation d'une échographie abdominale</td><td>24</td><td>92,3 %</td></tr><tr><td>C. Le dosage des anticorps anti insuline</td><td>12</td><td>46,2 %</td></tr><tr><td>D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures</td><td>14</td><td>53,8 %</td></tr><tr><td>E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale</td><td>10</td><td>38,5 %</td></tr></tbody></table>	Option	Count	Percentage	A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée	18	69,2 %	B. La réalisation d'une échographie abdominale	24	92,3 %	C. Le dosage des anticorps anti insuline	12	46,2 %	D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures	14	53,8 %	E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale	10	38,5 %	A/B/D/E
Option	Count	Percentage																																				
A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée	25	83,3 %																																				
B. La réalisation d'une échographie abdominale	10	33,3 %																																				
C. Le dosage des anticorps anti insuline	4	13,3 %																																				
D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures	10	33,3 %																																				
E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale	8	26,7 %																																				
Option	Count	Percentage																																				
A. Un dosage de l'hémoglobine glyquée	18	69,2 %																																				
B. La réalisation d'une échographie abdominale	24	92,3 %																																				
C. Le dosage des anticorps anti insuline	12	46,2 %																																				
D. Le dosage de la protéinurie sur les urines des 24 heures	14	53,8 %																																				
E. Le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale	10	38,5 %																																				
2 - Il existe deux types de diabète : le diabète de type I est de type II 30 réponses  <table border="1"><thead><tr><th>Option</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Vrai</td><td>17</td><td>56,7 %</td></tr><tr><td>B. Faux</td><td>13</td><td>43,3 %</td></tr></tbody></table>	Option	Count	Percentage	A. Vrai	17	56,7 %	B. Faux	13	43,3 %	2 - Il existe deux types de diabète : le diabète de type I est de type II 26 réponses  <table border="1"><thead><tr><th>Option</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>A. Vrai</td><td>6</td><td>23,1 %</td></tr><tr><td>B. Faux</td><td>20</td><td>76,9 %</td></tr></tbody></table>	Option	Count	Percentage	A. Vrai	6	23,1 %	B. Faux	20	76,9 %	B																		
Option	Count	Percentage																																				
A. Vrai	17	56,7 %																																				
B. Faux	13	43,3 %																																				
Option	Count	Percentage																																				
A. Vrai	6	23,1 %																																				
B. Faux	20	76,9 %																																				


3 - Dois-je toujours me baser sur le niveau d'hémoglobine glyquée pour adapter le traitement antidiabétique ?

30 réponses



3 - Dois-je toujours me baser sur le niveau d'hémoglobine glyquée pour adapter le traitement antidiabétique ?


26 réponses



B


4 - La prescription des capteurs de glycémies interstitielles est-elle réservée aux médecins spécialistes en diabétologie ?

30 réponses



4 - La prescription des capteurs de glycémies interstitielles est-elle réservée aux médecins spécialistes en diabétologie ?


26 réponses



B


5 - les inhibiteur du SGLT2 peuvent-ils être prescrits dans tous les types de diabète ?

30 réponses



5 - les inhibiteur du SGLT2 peuvent-ils être prescrits dans tous les types de diabète ?


26 réponses



B


6 - Dans les dernières recommandations de l'HAS, les analogues du GLP1 peuvent être prescrits en monothérapie dans le cadre du diabète.

30 réponses



6 - Dans les dernières recommandations de l'HAS, les analogues du GLP1 peuvent être prescrits en monothérapie dans le cadre du diabète.

26 réponses



B